



## Differential Equations

### 1. Definition of Differential Equations

**Differential Equation:** is any equation which contains one derivative or more. The derivative may be either ordinary derivative or partial derivative.

المعادلة التفاضلية: هي المعادلة التي تحتوي على مشتقة واحدة على الأقل أو أكثر، وتكون المشتقة إما مشتقة اعتيادية أو مشتقة جزئية.

$$\dot{y} + 4y - 3y = 2x \quad \text{or} \quad \frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} - 3y = 2x$$

**Solution of the Differential Equation** is finding an equation without any derivatives, and when substituted in the differential equation achieved.

حل المعادلة التفاضلية هو إيجاد معادلة خالية من المشتقات وإذا عوضت في المعادلة التفاضلية تحققها.

### 1.1 Classification of Differential equation:

Differential equation divided into:

1) **Ordinary Differential Equation:** independent variable = 1 المعادلة التفاضلية الاعتيادية

Ordinary Differential Equation (ODE): is an equation containing one independent variable.

المعادلة التفاضلية الاعتيادية: وهي المعادلة التي تحتوي على متغير مستقل واحد.

**For Example:**

$$y = x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \quad \text{or} \quad \dot{y} = 2x \quad \rightarrow$$

$$y = f(x)$$

where:

$y$ : is dependent variable متغير معتمد

$x$ : is independent variable متغير مستقل

**2) Partial Differential Equation:** independent variable  $> 1$  المعادلة التفاضلية الجزئية

Partial Differential Equation (PDE): is an equation containing more than one independent variable.

المعادلة التفاضلية الجزئية: وهي المعادلة التي تحتوي على أكثر من متغير مستقل.

**For Example:**

$$z = x^2 + y^2$$

$$\frac{dz}{dx} = 2x \quad \text{or} \quad \dot{z} = 2x \quad \rightarrow \quad z = f(x, y)$$

$$\frac{dz}{dy} = 2y \quad \text{or} \quad \dot{z} = 2y \quad \rightarrow \quad z = f(x, y)$$

where:

$z$ : is dependent variable

$x$  &  $y$ : is independent variable

**1.2 Order of differential equation:** رتبة المعادلة التفاضلية

The number of highest derivative in a differential equation. A differential equation of order 1 is called First order, order 2 is called Second order ..... etc.

هي اعلى مشتقة موجودة في المعادلة التفاضلية.

**For Example:**

$$\dot{y} + y = x \quad \text{First order}$$

$$\dot{\dot{y}} + 2\dot{y} - y = \sin x \quad \text{Second order}$$

**1.3 Degree of the differential equation:** درجة المعادلة التفاضلية

The highest power which is raised to the highest-order derivative existed in differential equation.

هو اعلى اس موجود على اعلى مشتقة في المعادلة التفاضلية.

**For Example:**

$$1) \dot{\dot{y}} + 2\dot{y} - y = 0 \quad \text{the degree is 1}$$

2)  $\ddot{y} + 3\dot{y} + \ln x = 5$     *the degree is 1*

3)  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + \frac{dy}{dx} + \tan x = 0$     *the degree is 3*

4)  $\frac{d^2y}{dx^2} + x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} = 0$     *the degree is 1*

**Note:** if highest-order derivative found inside the root or any form of fraction, the degree of this differential equation cannot be determined (undefined degree).

إذا كانت أعلى مشتقة موجودة داخل أي دالة مثل الجذر  $\sqrt{y}$  أو أي دالة مثلثية  $\sin(y)$  أو ضرب  $y$  فلا نستطيع تحديد درجة المعادلة التفاضلية.

For example:

$$\sqrt{\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx}} = x \quad (\text{undefined degree})$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \cos\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) = 5x \quad (\text{undefined degree})$$

### 1.4 Types of Differential Equation

There are two types of differential equation according to degree it:

- a) **Linear Differential Equation:** is a differential equation without nonlinear term and all of its terms are of first degree.
- b) **Non-Linear Differential Equation:** is a differential equation that contain nonlinear terms such as:  $\sin y$ ,  $e^y$ ,  $\sqrt{y}$ ,  $y^2$ ,  $y\dot{y}$  or  $\ln y$ .

كي تصبح المعادلة خطية (linear) يجب ان يكون كل حد من حدود المعادلة الذي يحتوي على المتغير المعتمد (y) ومشتقاته من الدرجة الأولى، أي يجب ان لا يظهر أحد حدود المعادلة على شكل مثلًا:  $\sqrt{y}$ ،  $e^y$ ،  $\sin y$ ،  $y\dot{y}$ ،  $y^2$ ، .....  
 .....،  $y\dot{y}$ ،  $y^2$

For example:

1)  $\dot{y} + y\dot{y} = x$     (*Non – Linear because  $y\dot{y}$* )

2)  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + x \frac{dy}{dx} = \sin x$  (Non – Linear because  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3$ )

3)  $\dot{y} + 4xy + 2y = \cos x$  (Linear Equation) لا تعتمد على  $x$

4)  $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + \ln y = 0$  (Non – Linear because  $\ln y$ )

5)  $\frac{d^2y}{dx^2} + x \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \tan y = 4$  (Non – Linear because  $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$  &  $\tan y$ )

### 1.5 Solution of the differential equation: حل المعادلة التفاضلية

There is multi-solution for the differential equation:

**1. General Solution:** it is a solution that contain one or more essential constant.

الحل العام: هو ذلك الحل الذي يحتوي على ثابت اختياري واحد على الأقل.

**For Example:**

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \rightarrow \int dy = \int f(x) \cdot dx + c$$


where  $c$ : is essential constant

دائماً عدد الثوابت الاختيارية تساوي او اقل من رتبة المعادلة التفاضلية.

**2. Particular Solution:** it is a solution obtained from general solution by finding the values of essential constants. it depended on:


الحل الخاص: هو ذلك الحل الذي نحصل عليه من الحل العام بإيجاد قيم الثوابت الاختيارية. وعادة يحتوي على شروط لإيجاد الثوابت الاختيارية:

**a- Boundary conditions for static problems**



**b- Initial conditions for dynamic problems**

For Example: Initial conditions at  $(t=0)$



**3. Singular Solution:** solution cannot be found from general solution.

الحل الشاذ: هو ذلك الحل الذي لا يمكن الحصول عليه من الحل العام.

**4. Complete Solution:** it is a solution that by which can get all the solutions of the differential equation.

الحل التام: هو ذلك الحل الذي يمكن الحصول على جميع حلول المعادلة التفاضلية.

**Example (1):** Prove that  $y = a e^{-x} + b e^{2x}$  is a general solution for the differential equation  $\dot{y} - y - 2y = 0$ ?

**Solve:**

$$\dot{y} - y - 2y = 0$$

$$y = a e^{-x} + b e^{2x}$$

$$\dot{y} = -a e^{-x} + 2b e^{2x}$$

$$\dot{y} = a e^{-x} + 4b e^{2x}$$

sub  $y$ ,  $\dot{y}$ , and  $\dot{y}$  in above D. E:

$$\therefore a e^{-x} + 4b e^{2x} + a e^{-x} - 2b e^{2x} - 2a e^{-x} - 2b e^{2x} = 0$$

$$0 = 0 \quad \therefore ok$$

**Problems:**

**H.W:** Prove that each of the following differential equation has the given general solution for all values of the constant a and b:

1)  $\dot{y} - 6\dot{y} + 9y = 0$ ,  $y = a e^{3x} + b x e^{3x}$

2)  $\dot{y} + (\dot{y})^2 + 1 = 0$ ,  $y = \ln|\cos(x + a)| + b$